



予防接種スケジュール（0歳から思春期まで）



ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期／思春期									
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上		
肺炎球菌	不活化			①	②	③					④														
B型肝炎	不活化			①	②					③															
ロタウイルス (口から飲むワクチン)	ロタリックス 生			①	②	(注1)																			
	ロタテック			①	②	③	(注2)																		
5種混合 (DPT-IPV-Hib)	不活化			①	②	③					④	(注3)		(7.5歳まで)							11歳～2種混合接種 (ジフテリア・破傷風)		①	12歳	
インフルエンザ菌b型 (ヒブ)	不活化			①	②	③	※5種混合を接種している場合は不要です				④														
BCG	生								①																
麻疹・風疹混合 (MR)	生										①										② (注4)				
水痘	生										①		②												
日本脳炎	不活化														①	②	③	(7.5歳まで)				④	9～12歳		
ヒトパピローマ ウイルス (HPV)	9価	不活化																				小6	中1①②	中2～高1相当	(注5)



定期接種の
推奨期間



定期接種の
接種可能な期間



任意接種の
接種可能な期間



接種等の問い合わせは健康づくり課(0162-23-4000)へ



注意事項の説明

(注1) 計2回、②は、生後24週までに完了すること

(注2) 計3回、③は、生後32週までに完了すること

(注3) ③-④は6か月以上あけ、標準的には③終了後12-18か月の間に接種

(注4) 小学校入学前の1年間

(注5) 標準的な接種ができなかった場合、定期接種として以下の間隔で接種可能

・9価ワクチン(15歳未満で始める場合)：①-②の間は6-12か月あける。ただし、この間隔をあけることができない場合は、

①-②を5か月以上の間隔をあければ接種可能である。(合計2回接種)

(15歳以上で始める場合)：①-②の間は1か月以上、②-③の間は3か月以上あける (合計3回接種)

参考：日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール
厚生労働省ホームページ